類證普濟本事方續集

類證普濟本事方目録

儀眞　士述

第一卷

金鎖正陽散

第二卷

治偏頭風方　治急中風方 口閉涎上欲垂死者

治頭風 大陽穴痛　治避嵐氣　牛黃散 治驚風退熱化涎

玉液膏 生津液　治一切頭痛　治傷寒頭風

又方 治同上　治頭風方　治纏喉風

治中風 手脚不遂　追命散 有証論　救命散 治風解毒

治一切風疾

第三卷

治諸氣冷等疾　方計二十道

治一切氣疾　治婦人血氣 治丈夫婦人氣疾

治血氣痛 婦人室女　和氣散 治丈夫婦人氣疾　治小腸氣方

第四卷

治口舌牙齒諸疾　方計一十九道

治諸眼目等疾

方計二十九道

第五卷

第六卷

治諸瀉痢等病大小便秘　方計二十道

治冷熱痢方　治一切痢方　治赤白痢方

治赤白痢　又方 治同上　又方

治瀉痢　治水瀉 幷痢赤白　治大便秘結方

治大小便秘結 及腸風疾　治大便秘結方

治肺臟熱壅大便秘　五宣散 治大小便秘

治大小便秘方　治赤白痢方　治痢藥方

治痢妙應圓　治一切重痢　治痢疾方

治婦人胎產痢方

第七卷

治諸痔漏等疾　方計三十道

第九卷

類證普濟本事方目録 終

類證普濟本事方卷之一　　續集

儀眞許　學士述

○治諸虛進食生血氣并論

夫人稟陰陽五行運氣榮衛而保全其身化一身中或有毫杪疾患無非因臟腑虛冷臟腑虛冷則榮衛不調榮衛不調則疾生矣又況虛冷之極又能生其虛陽或手足腰腎則眼目口齒三焦六腑值病之烈則各能死人且如左右手三陰三陽十二經脉皆須用有胃氣或加之有疾而無胃氣者不問病之輕重不救何謂須用有胃氣緣胃受穀氣穀氣生則能生氣血氣血壯則榮

衛不衰榮衛不衰則病自去矣如五臟六腑表裏之間皆出自穀氣而相傳授生氣血而灌溉五臟故氣血不足則五臟六腑蔭無所自况加之於憂思慮喜怒不常起居勞役飲水不節房事過多衝雪冒霜伏暑解熱損失耗散則病生焉且如季春季夏季秋季冬一十八日之間脾土於此時王極每遇此際腎水受尅故當補腎所以心肺肝脾腎各有衰旺各有相生相尅如心尅肺肺尅肝肝尅脾脾尅腎腎尅心遇旺則尅之愈甚凡受尅處故宜補然春補脾夏補肺秋補肝冬補心古之賢人平居無病亦常用方藥法度調護脾胃使進飲食而

全穀氣凡百皆得其宜如今之庸醫用意皆錯姑舉一二而爲證然且如腎經衰敗則以天雄附子之類而言補腎且腎本屬北方壬癸水喜濕惡燥反用天雄附子至燥藥豈能補乎腎耶況腎經虛則乃五臟六腑衰極而漸至腎則諸病生焉凡下部腎經虛者不必補之至妙之法有二一則但補理護胃使進飲食而全穀氣人之生氣血所謂者可每月夜半子時乃北方正[illegible]當此之時腎水旺極則攝血化精精氣全則實腎經不虛病自去矣男子則攝血化精女子則通月事若穀氣不全則氣血不生氣血不生則當夜半子時腎水難旺則血

不能償其腎所損無精可化丹田不固腎自虛矣以此觀之允腎經并五臟虛敗醫者不識源流枉用其法初不能損於病乎今則具列先補脾胃後調氣血二方并法悉皆備集予不欲私爲已有用傳好事云耳

戊已圓治丈夫婦人稟賦怯弱飲食無味氣血衰敗肌肉不生項背拘緊腰脚無力胸膈膨脹多睡少寐終日昏滕夜多異夢及積年脾瘧痔下惡心噫酸吐水小兒吐乳大人翻胃並皆治之此藥能護脾開胃進飲食長肌肉生氣血化精益髓全胃氣丹田不竭腎經不虛是此藥功也

茴香 三兩揀淨　甘艸 一兩炙　浮椒 五兩乃胡椒也揀淨　人參 一兩

白朮 一兩　朱砂 半兩　白茯苓 一兩　香附子 半兩

右爲細末生姜汁打麪糊爲圓如梧桐子大每服二十圓空心白湯送下日二服

又方

石菖蒲 一兩　白茯苓 一兩　白朮 一兩

茴香 一兩半　青皮 一兩　枳殼 一兩麩炒

右爲末每服二大錢棗湯調空心服

又方

枳殼 一兩　木香 一兩半　丁香 半兩

壮蠣二兩半　甘艸　白茯苓一兩

右爲細末米飲送下三錢不計時候

又方治大人婦人小兒唇青面黄肚裏冷痰牽引小腹以至翻胃換食嘔吐口苦舌乾少穌多寤脚手不擧遠年日近一切脾胃冷病悉能除愈有一婦人年四十餘患十年翻胃面目黄黑歴三十餘人醫不取效脾腧諸穴燒灸交遍其疾愈甚服此藥不五七日間頻然無事緊悉服至一月日遂去其根自是服之不三五服些少脾疾立便痊平能全胃氣生肌肉進飲食順榮衛常服大有補益悉試悉驗幸毋忽焉

人參 一兩　茯苓 二兩　附子 七錢重炮去皮臍一兩

牡蠣 煅一兩　粉草 半兩　黃芪 蜜炙一兩

右為末每服三大錢鹽湯點服忌生冷油麪粘膩等毒物無不效者甚妙

又方

浮椒 二兩　茴香 二兩　粉草 一兩

右三味為末每服二錢鹽湯點服忌毒如前

化癥圓治丈夫婦人小兒年深日近沉積癥塊面色黃青時上臉心吐水吞酸舌生白沫婦人積年月經不調漸成血氣或蠱塊中焦之間覆如杯椀連年累月漸至

搶

瘦癖寒熱往來一切脾胃受寒久不瘥癒之疾並皆治之

巴豆五兩去油膜　蓬莪朮三兩醋煮　荊三稜三兩醋煮　丁香皮三兩

木香一兩半　厚朴三兩　石菖蒲二兩　良姜一兩

䗪蟲一兩半　川牛膝一兩　香附子四兩　石蓮二兩

右爲細末稀麪糊爲圓如小菉豆大積年癥瘕成塊第一服用熱水下二十圓自後每日三圓五圓更量虚實加減與之五日去盡積塊日近脾胃有積者每服五圓飯飲呑下一服取效婦人血氣成塊及血瘕每服二十圓蘇木用酒童子小便各一半煎五七沸令溫空心呑下自後每日用溫酒下三圓其血塊逐

旋消從大小二便去盡自知小兒蛔蟲腹痛不能忍日夜叫喚百藥不救者橘皮湯下七圓立效諸蟲皆下常服白湯或薑湯下三五圓中酒及酒積大便鮮臭者白湯舊酒各半吞下七圓立效如神一切瘀塞心下硬痛皆用棗湯下五圓不拘時候

衛眞湯治大人婦人元氣衰憊榮衛怯弱眞陽不固三焦不和上盛下虛夜夢鬼交覺來盜汗面無精光唇口乾燥耳內蟬鳴腰背倦痛心氣虛乏精神不寧驚悸健忘飲食無味日漸瘦悴外腎濕痒夜多小便腰重冷疼牽引小腹足膝緩弱行步艱難婦人血海久冷經候不

調或過期不至或一月兩來赤白帶下漏分五色子宮感寒久不成孕並皆治之此藥大能生氣血過夜半子時腎水旺極之際償腎收攝男子攝血化精實丹田塡五臟諸病未萌之前皆能製治使不復爲梗是藥也每服多寡具刻在前

川當歸三兩　人參一兩半　金釵石斛五兩　白茯苓

木香　肉豆蔻　山藥各三兩　生地黃二兩半

熟乾地黃三兩　丁香一兩　青皮一兩　川牛膝二兩童子小便酒各半浸一宿

右爲細末每服三大錢溫酒調下鹽湯亦得空心食後一服婦人諸疾用童子小便同溫舊酒調空心下

內丁圓生血養氣升降水火化精補腎

附子 一个九錢重者炮　川烏 一个七錢重有炮　當歸 二兩

赤芍藥 五兩　沉 五兩

右爲細末浸當歸酒煮稀糊爲圓如梧桐子大朱砂爲衣每二十圓漸加三十圓食前空心鹽酒湯下婦人淡醋湯下

又方治男子婦人一切虛冷之疾活血駐顏減少便除盜汗治婦人久不生產似滯疾而非時有遺瀝並皆治之功驗不可具述

蒼朮　吳茱萸　破故紙

胡盧巴 已上各一兩　川姜　草烏 已上各半兩並炮　山藥 二兩

右各精細炮治如法同爲末酸糊圓如梧桐子大每服十五圓空心溫酒鹽湯任下婦人艾醋湯下日二服丈夫四十歲已上者可常服耳目永不昏聾髭髮不白

又方回陽小浴法

川烏　沉香　紫梢花

蒺藜　蛇床子 酒浸一兩　兔絲子 各等分

右爲末冷熱水圓如彈子大每服一圓湯三大椀椒二合葱二握用闊口罐同煎取二椀去却葱根椒安

身於舡口上薰如入得手則浴之冷便止女人帶下赤白者依此薰之留取藥得三次溫過薰洗妙

又方治後生大人婦人房事不節漸至虛損行步艱難空夜夢從高墜下及費大小諸般水費並皆治之常服永無疾病雖二十歲亦可服

人參　白茯苓　川牛膝 酒浸一兩

地骨皮 真者　川當歸　熟地黃 各等分

右為末煉蜜為圓如梧桐子大每服三十圓溫酒或鹽湯空心下常服只二十圓用三五匙乾飯壓下服三五日後每日飽飯後及臨臥時服局中雞頭圓五

十粒不嚼破熟水吞下次又服煎藥百病皆去雖百歲鬚髮不白紫余日二十歲服之不歇甚妙

又方治後生丈夫酒色過多下元虛憊膝軟乏小便滑數針腎濕痒

兔絲子五兩　石蓮肉二兩　白茯苓一兩

山藥二兩　茴香二兩　五味子五兩

右為末稀糊為圓如○大每服四十圓溫酒或鹽湯空心下如脚氣及脚膝無力者木瓜酒空心五十圓晚食前再服立效

又方補虛損老少皆可服一切虛證並皆治之

人參　桂　茯苓　黃耆

熟乾地黃　川芎　甘草　川當歸各等分

右各依法事治爲末每服二大錢水一盞生姜三片棗子二枚同煎至七分空心服

又方治勞嗽及虛證及鼻流清涕耳作蟬鳴眼見黑花一切虛症丈夫婦人皆可服少年服亦不効

北五味子二兩　鱉甲三兩厚者　地骨皮三兩

右爲末煉蜜圓如梧桐子大空心食前溫酒或鹽湯任意服三十五十圓婦人醋湯下此方乃曲江人家秘方余服之大有功效處方有理者人皆欽姜妙甚

勢甚

又方補虛損治勞倦一切虛極欲垂死者

甘艸三兩　蒼朮一斤米泔浸一宿切作片子用韮白一斤細切同令氣透一宿透

川椒四兩　草烏半斤水浸一宿切作片子同鹽四兩令盡一宿次日炒乾

右共為末用好舊精六斤同擣三五十杵令勻為圓如梧桐子大每服二十三十圓空心溫酒鹽湯任下婦人淡醋湯下

又方治胸滿氣噎下部冷腹疞痛

半夏八兩　生姜六兩　橘皮四兩　桂二兩　吳茱萸五兩湯泡洗七次

右㕮咀用水十升煮取四升分五服冷又再溫空心

食前服余少年時冒患臍疠痛初不疑其蟲證服諸家藥無獲效者余遂診之則覺是蟲證合此藥一劑服未至半劑頓然痊瘥

又方治下部冷極臍下及小腹痛不可忍者一服取效

赤石脂　乾薑各十兩

右二味爲末麪糊爲圓如豌豆大每服十圓至三十圓空心飯飲下日三服

御方二仙散治腎氣

蓬莪朮一兩　茴香二兩　阿魏三錢真者

右三味爲末每服二錢溫酒調下

項

金鎖正陽丹

砒一兩火煆　巴豆十兩去油　烏頭一兩炮　木鱉六个　雄黃半兩

右已上併爲末用黃臘瀝青好者各一兩半黃丹一兩朱砂一兩半細研溶熱入前項藥末乘熱圓如雞頭大每服一圓常服空心鹽湯下小腸氣痛炒茴香酒冷下木通煎湯下滑腸脫肛乾姜艾同煎酒溫下心氣痛燒錢淬醋下二圓氣塊嚼乾柿子下一圓婦人紅脉不行及產後諸疾當歸酒下眼多冷泪鹽椒湯下

類證普濟本事方卷之一終

類證普濟本事方卷之二　　續集

儀眞許　學士述

○治諸積熱等疾

治脚氣毒遍內外煩熱不解口中生瘡狂走毒厲及解中諸熱藥毒邪熱卒黃等解蠱毒鬼魅野道熱毒又治小兒驚癎熱病

寒水石　石膏　磁石

滑石 已上四味各三斤搗爲末用水一石煮至四斗去滓入後藥　玄參　羚羊角 四兩

升麻 五兩　丁香　木香 半兩

甘草 八兩已上六味搗爲末入前藥汁中再煮取一斗五升去滓入下項二味　朴消 三斤

已 頂

消石好者當 同寸本一兩此 分為二兩外 注三味之三主 治二

按外以恐裂 領恐鎖

消石好者二斤已上二味入前藥汁中微火煎不住手將柳木篦攪候有七八分許投在水盆中半日久欲凝後却入後頂二味

朱砂三兩 麝香 當門子一兩三錢重乳細已上三味入前藥汁中攪調令勻

右當寒之二日每服一錢七或二錢冷水調下大人小兒子細加減食後服

又方治大人小兒五臟積熱煩燥多渴唇烈喉閉目赤鼻衄頷頰結硬口舌生瘡陽明證傷寒發狂見鬼譫語大小便秘一切風壅並皆治之

川大黃 山梔子仁一兩 朴梢二兩 連翹

薄荷二兩 甘艸一兩 乾葛 赤芍藥一兩

右爲剉散每二錢水一盞入竹葉七片蜜三七同煎

至二七分去滓食後服唯陽明証傷寒空心下此藥局方亦載緣昧數與用藥之法大既不同予一姪婦忽患熱病欲死付之一味立效後來屢服屢驗伏辛丑忽

又方

白朮　荊芥　赤芍藥各三兩　大黃

車前子各二兩生　木通三兩　甘草一兩　川當歸二兩

右為細末大便秘結米泔調三錢空心服上膈壅熱或生赤丹或如癰瘡用水二盞煎三大錢服小便澁如淋狀用蘆根打碎淨洗煎湯調下五心煩熱生薑一片同煎三錢服此方初來之不得後責數緡贖托

來汝至三方始得之屢服有效

東京金宅龍腦圓治腑中虚熱肺熱喘嗽口臭喉腥[illegible]疽口苦求夫吐血婦人血崩並皆治之

龍腦　薄荷五兩　眞蒲黃一兩　麥門冬二兩

阿膠一兩　甘艸一兩半　人參一兩　川當歸一兩

黃耆一兩半　木通一兩　生乾地黃　柴胡兩半

右爲末煉蜜圓如梧桐子大每服二十圓病上焦飯後用熟水呑下微嚼破更好病下焦空心服小兒加減與之此藥大有奇效不可盡述

又方治男子女人小兒胃中客熱口臭牙宣赤眼口瘡

解

一切瘡疹已發未發或可服之

熟地黃　生地黃　天門冬　黃芩

枇杷葉　山茵陳　枳殼　金釵石斛

甘草　犀角各三兩

右爲末每服二錢水一盞煎至七分去滓食後臨臥溫服小兒一服分作二服更斟酌與之此方得某一品之家其間用犀角一味甚有道理百發百中予族中有一僕牙宣口臭牙齒漸至頹落予與二服立愈服之久殊不效諸本事方前集所未載此數方緣得之不易今不欲爲之已有不能廣利一切謹附此與衆

共之明醫者必嘆賞

又方解一切暑毒欲死者使服之立甦

半夏（四兩醋一升半煮盡醋焙干）　甘艸（一兩）　桂（半兩）

赤茯苓（一兩）　白茯苓（一兩）

右爲末用生姜汁作麪糊爲圓如〇大每服五十圓熱水下予夏月登途嘗此藥於藍笥中防諸緩急及僕伻門毎日一服終無伏暑之疾奇驗不一

〇治諸風等疾

治八般頭風

草烏尖　細辛（等分）　黄丹（少許）

右爲細末葦管搐入鼻中立效

治偏頭風　王荆公方云禁中秘方

右用好蘿蔔自然汁一蜆殼盖患人仰卧右疼注左左疼注右或兩邊皆疼皆注之雖十年患者亦效王荆公患十二年用之立效後醫數人皆愈

治頭疼及腦風神砂圓

鹽　硫黃各等分

右爲末水調生麪爲圓如梧桐子大每服十五圓用薄荷茶食前下荆芥酒亦得

又方定頭疼

楊梅青　　硝石　　地龍各等分

右爲細末搐鼻立效上件四方得自至人累試有驗余鄉間有富室就余傳此方修合施人

治偏正頭風夾腦風并一切頭風不問年深日近悉皆(?)取效名透頂散

細辛長白者三莖　　瓜蒂七个　　丁香三粒

糯米七粒　　腦子一豆大　　麝香一黑豆大

右先將腦麝乳鉢內研令極細却將前四味碾內阜(?)治爲末入乳鉢內蕩起腦麝令勻用尾(?)甑(?)子盛之堅閉藥口患人隨左右搐之一大豆許量久出冷涎一

升許即安

清頭目去風邪順真氣

羌活　殭蠶各一兩　白蒺藜去尖炙一兩　甘菊一兩

白附子一兩　朱砂一兩　麝香一兩

右為細末每服一錢薄荷茶酒任意調下

治丈夫婦人風虛頭疼氣虛頭疼婦人胎前產後傷風

頭疼一切頭疼並皆治之

茵蔯五兩　麻黃　石膏煆留性各二兩

右為末每服一錢臘茶下食後服服畢仰臥

治風眉極燥無時此乃氣虛風邪侵於皮表而生焉須

此藥治之甚妙

蒺藜根

右一味不拘多少爲末先洗頭須避風好最候未至十分乾時用藥摻定須用藥末入髮至皮方得緊緝之兩日夜次日全無亦不燥痒如尚有些少可再用一次立效

又方

香白芷　零陵香各等分

右爲末如前法用之候三五日後篦去再付三二次終從不生

治頭風荊芥散 王大醫方

荊芥　石膏各等分煆

右爲細末每服二錢薑三片葱白三寸和鬚使水一盞同煎至七分食後服

治偏頭風方

豬牙皂角去皮筋　香白芷　白附子各等分

右爲末每服一錢臘茶清調下右疼右側卧左疼左側卧兩邊皆疼仰卧食後服

治急中風口閉涎上欲垂死者一服即瘥

江子七粒去皮膜　白礬一塊如大拇指大末之

右二味於新瓦上煆令江子焦赤爲度爲末煉蜜丸如雞頭大每服一圓用綿裹於患人口中近喉邊良久吐痰立效

治頭風頭暈目旋太陽穴痛不思飲食

藿香 茯苓 香附子各一兩

右爲末每服二錢茶清調下日三服

清頭目避嵐氣

蒼朮四兩 荊芥 甘草各一兩

右三味爲細末每服一大錢沸湯點早晨服凡人煙瘴之地宜修合隨行余昔入廣合合一劑每日一服

及歸不染瘴而至僕价門亦嘗與之無洗瘴疾者又況能清頭目效驗多端

治大人小兒驚風退熱取涎牛黃散

朱砂 一錢　麝香 一字　腦子 眞者半兩　水銀 一錢

牛黃 一字　狗黃 一字　雄黃 一字　令香 半兩

右爲末將前四味爲末頻處後四味末放一處臨時拌勻每服一字或半錢薄荷湯入金銀箔同調下如用取涎入江子二粒去油藥二錢和勻可服半字薄荷茶清調下量大小虛實加減與之

生津液玉液膏

紫蘇四兩　板桂半兩　甘艸　白荳蔲仁各二兩

右件上三味為末搗白梅肉為圓如雞頭大每服含化三圓

治一切頭疼

防風　川芎各一兩　附子七錢重者一個炮去皮臍

右為末每服一字荊芥薄荷茶調下

治傷寒頭疼并太陽頭疼及一切頭風

川烏炮　草烏各半兩　麻黃一兩半　川芎　防風

羌活　土龍去土　全蝎十個　雄黃三錢

右為末每服半錢食後茶清調下

又方

川芎一兩　細辛半兩　香附子　羌活

蒼术各一兩　薄荷一兩　甘艸三錢　白芷二兩

甘菊一兩　荊芥二十文　茵蔯五文

右爲末每服二錢茶清調下婦人產後傷風頭疼用當歸末石膏末同調下

頭風方

香附子一斤炒赤　烏頭一兩炒赤　甘艸二十文

右爲末煉蜜圓如彈子大每服一圓葱茶嚼下

治纏喉風

白礬半錢　烏雞子清

右二味調勻灌入喉內立效如神此方活人不記數幸勿忽

治中風手脚不遂此方甚妙

穿山甲二兩　川烏頭二兩　紅海粉二兩

右爲末每服半兩用生葱自然汁調成膏厚作餅子約徑寸半闊左患貼左脚右患貼右脚貼在足掌心內用舊絹片緊扎定於密房中無風處椅子上坐用湯一盆將有藥脚浸於湯中用小心人扶病人若汗出即急去了藥出汗遍身麻木即輕減漸至無事此

妙不可言

治大風神效追命散

川大黄　皂角刺各半斤　川乙金五兩

右三味爲細末每服三大錢用眞大楓油入無灰酒溫調藥末臨睡時服臟腑轉時只就地上取不可如疾多年其虫色黑日近者其虫色赤隔三兩日再服直候無虫方是病瘥耶上其藥只服平常風藥不語補藥此藥大有奇效下藥切不可許病人知恐虫藏蠶刑病難愈六十日內用清齋戒房色歇却一切俗念亦不可嗔怒常淨口念阿彌陀佛及救苦難觀世

音菩薩過數滿百万聲最好緣此疾乃[illegible]障果報若用藥醫得病可之後恐促其壽故用念佛懺悔伏幸聽信斯言至祝

治風解毒雄黃救命散

雄黃 二錢重　川乙金 二錢重　巴豆 四十粒去油

右爲細末用醋糊爲圓如菉豆大每服三圓至五圓茶清冷下病于後○治纏喉風走馬風喉閉卒中仆地失音以至牙關緊急不知人事每服七圓熱茶下甚者不過二服吐出涎立甦有至死者但心頭暖用鐵物挒開口灌之藥咽喉無不活者或吐或瀉些少

不拘或上膈壅腫並宜服之小兒驚風量大少加減與之

治一切風中及左癱右瘓眼喎邪一切風疾

皂角三十挺刮去黑皮并子剉酒浸一宿焙留性一宿炙　薄荷三兩

黑牽牛三兩　何首烏十二兩

右先將皂角為末入水得其中熬成膏却入後三味搗一二千杵為圓如梧桐子大每服二十圓茶酒任下

類證普濟本事方卷之二終

類證普濟本事方卷之三　　續集

儀眞許　學士述

○治諸氣冷等疾

治一切氣疾丈夫婦人撞心冷氣並治之

香附子 一斤炒　陳皮 四兩　甘艸 一兩

右爲末每服二錢空心鹽湯點服

治婦人血氣刺痛大小腹痛並血脉不調走疰疼痛並治之

川當歸　白芍藥 各一兩　香附子 半斤

山慈姑 三兩　熟地黃 二兩　甘艸 一兩

右㕮咀每服三錢水一盞烏梅一箇荊芥少許同煎至七分溫空心服如腹中冷痛不止者加阿膠二片同煎立效

治婦人室女血氣刺痛不可忍夜哼喚可憐者一服見效

雲臺子　肉桂　良姜　沒藥各等分

右乾焙爲末每服二錢乳香酒調下熱服不拘時候

和氣散治丈夫婦人一切氣疾他不瘳者

甘草炙半兩　白芨一兩　地骨皮一兩　藿香半兩

山蜈蚣一兩　白芷一兩　紅內消半兩　木香半兩　山慈姑一兩

右焙乾爲末每服二大錢空心鹽湯點服余鄉曲有一老醫數世習醫凡婦人氣疾唯憑此藥百發百中家有十口只以此藥養家

治小腸氣痛不可忍者

烏藥擣研好舊酒浸一宿　高良姜　茴香船上者三味各一兩　青皮二兩

右爲末每服二錢遇發時熱酒調下

又方

杏仁一兩　葱白和根擣焙乾半兩　舶上茴香一兩

右爲末每服三大錢空心温胡桃酒調下

治膀胱氣

青礬一兩 白礬一兩

右用小瓦罐子一雙入藥於罐內用麻皮緊縛泥如法堅牢固濟炭五斤煅令通紅盡炭爲度取出入坩窩內去火毒二宿爲末醋糊爲圓如菉豆大每服十圓空心鹽湯下或白湯亦好

治疝氣

官桂一兩半 蛇床子一兩半 柴胡 細辛 白芷各二兩

右㕮咀每服五大錢水二升外葱白和鬚二莖椒五十粒同煎至七分於瓶口上薰合微汗出再暖通手洗婦人帶下赤白薰之亦效婦人用可加紫蘇一握

又方

大蒜 三个　韭菜 一握　鮮菜 一握

右用大砂罐内煎令百沸乘熱薰之候入得手則洗之如冷則再煖日三次立效

治疝氣立效散

川芎　川楝子　青皮

舶上茴香　桃仁　黑牽牛 已上各一兩

右焙乾爲細末每服二錢無灰酒一盞煎至八分溫服

灸法　治腎氣外腎腫小腸氣痛腹内虛鳴灸風市穴

五七壯灸氣海穴七壯灸臍左右各去一寸半兩穴各七壯

右予曾患此疾灸之立效後來不發甚妙

治脹氣

夜明砂（不拘多少為末）

右用豉汁調塗立效

又方

銅青（米醋調成膏）

右先淨洗腋下用輕粉摻過却使上件膏塗之立效

又方

膩粉　明礬　紅丹各等分

右為末臨臥時抹之佳可使半月日去根

治小腸寒方

鐵殼一兩　舶上茴香一兩

右為末每服三錢臨發時空心熱酒調下

又方

赤香一兩　天南星半兩　良姜半兩與天南同用麩炒令赤色

右為末每服二錢無灰酒一盞煎三兩沸空心服此

二方皆賢生專修合貨賣供五占

治小腸氣痛撞腹面青唇黑欲死者

木香　茵蔯　芫花　甘遂 各等分

右件爲末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服服此藥後應犯甘艸藥皆不得喫恐與甘遂相反故也其藥甚妙緣處方者有理屢有效驗

又方

川楝子　茴香　川烏 炮　破故紙 各等分各炒令黃色

右焙乾爲末酒糊爲圓如梧桐子大每服二十圓鹽湯溫酒任下忌生冷動氣一切毒物

治遠年小腸氣衆醫不瘥者

硫黃　船上茴香 炒令黃不可犯銅鐵器各等分

右為末每服五錢用熱酒調空心溫服永除根本

治膀胱氣金蓮散

巴豆一百粒　川楝子二十四个湯浸去薄皮切作片子

右二味用麩二升同炒令黃赤去麩與巴豆不用只將川楝子一味為末每服三錢溫酒調空心下余閱古今一切名方無如此方奇特效

○治諸腰疼等患

治腰疼痛用轉下腰水

黑牽牛　白朮各一分　桑白皮一兩　木通半兩

右為細末每服三錢茶清調下四更時服轉了粥補

又方治久患腰痛

石斛瓜一兩　附子炮了半兩　冬瓜皮半兩

檳榔　木香　烏藥各半兩

右為細末每服一大錢溫酒調下臨睡服此日只午後申時先喫了晚飯申時尚後不得喫食專候臨臥時服藥

治腰腳筋骨疼軟無力酒浸牛膝圓

牛膝二兩炙黃　川椒半兩　附子一個十錢重者炮去皮臍

右㕮咀用生絹作袋子袋盛縫結其袋口用無灰酒一斗春秋浸十四日夏浸七日冬浸十日每日空心

飲下大盞候飲盡酒後出藥爲末醋糊爲丸每服二十丸空心溫酒鹽任下忌動風等物

治五般腰疼

巴豆（五十个每个用濕帋裹煨令熱去殼取肉去油只使半出油半微去油）　五靈脂（半兩炒）

黑牽牛（瓦上炒）　白牽牛（同各三錢重）　狗脊（半兩）

萆薢（三錢重）　沒藥（三十文）　胡桃（十个取肉研爲膏）

右件爲末將前胡桃膏入醋糊爲圓如梧桐子大每服十五圓風腰痛豆淋無灰酒下氣腰痛煨葱白酒下敗精腰痛茴香酒下失血腰疼當歸酒下打撲腰疼蘇酒下

又方治五種腰疼

狗脊　萆薢　兔絲子各二兩酒浸炒乾別研

右爲細末煉蜜圓如此〇大每服三十圓用萆薢二兩浸酒三日取酒服藥空心食前服

又方治遍身皆痛如勞證者傷寒身體疼者不可服但少年盡損冷憊老人諸疾並皆治之

黃耆　人參　茸艸　附子炮　羌活

木香　知母　芍藥　川芎　前胡

枳殼　桔梗　白朮　當歸　茯苓

半夏各半兩　柴胡　鼈甲各一兩　桂心

酸棗仁各一分　杏仁半兩

右為末每服二錢水二盞姜三片棗子三枚烏梅三莖葱白三寸同煎至七分空心溫服

異功散治婦人血冷氣痛心腹煩悶不思飲食四肢無力頭目昏疼寒熱往來狀似勞倦並皆治之

牡丹　芍藥　白芷　乾姜已上各三錢

當歸　陳皮　官桂　玄胡索

川芎　苦梗已上各半兩

右為末每服二錢生姜三片酒水各半盞煎至七分溫服初生時宜服此藥每日三服七日後漸減服數

至十日滿永無疾病服後些少腹痛不妨事勿嘈嗜

〇治諸脾胃等疾

開胃進食丁香湯

藿香半兩　巴豆二十粒　丁香四十九粒　粟米一合

右先將粟米巴豆肉同炒令赤色去巴豆不用只使粟米與丁香藿香同研爲末每服二錢米飲調下

大黃湯治冷涎翻胃其候欲發時先流冷涎次則吐食此乃勞證治之不早死在旦夕

大黃一兩生薑自然汁半茶盞炙大黃令又淬薑汁中如此淬盡切焙爲末

右每服二錢陳米一撮葱白二莖水一大盞煎至七

分先食葱白次服其藥不十日去根

又方治翻胃吐食

白礬二兩　黄丹一兩

右二味爲末入瓦罐子内煅令如蒸餅麄空取出以

淨濕兼頻地上盆蓋一出火毒再爲末用蒸餅爲圓

如菉豆大每服三五圓至七圓空心溫酒下更量老

少虛實與之

又方治宿食不化嘔吐酸水胸膈否悶冷氣腹痛肺寒

咳嗽並皆治之

陳皮四兩　生薑一兩半　甘草一兩炙

右件咀炒令黄赤色焙乾研爲末每服二大錢薑湯

點服

又方

烏梅二个 縮砂三粒 胡椒二十四粒 丁香十四粒 巴豆四粒

右爲細末研飯爲圓如此○大每服七圓橘皮湯下

治脾疼不問新久

高良薑 紅芍藥各等分

右爲末每服三錢水一盞煎五七沸食後服

治丈夫婦人老少遠年日近翻胃吐食方

五靈脂

右一味不拘多少爲細末用黃犬膽汁爲圓如豌服大每服一圓好酒半盞熨湯瓶頭温磨開服不止再服不過三服即效

又方治胸膈不快酒食所傷漸成翻胃令乾嘔

丁香　巴豆　烏梅各二十个好完台者

右三味皆不去油殼并核搗三五千杵成膏入旱米飲一兩同搗又二千杵令極匀細衆手圓如[illegible]大慢火焙乾淨紙兼瓶地上出火毒每服五圓或七圓茶酒熟水任下如嘔吐酸水心腹氣痛膨脹者橘皮甘草湯下

治傷積有滯食噫酸餇氣心腹氣膨小腹不仁或時溏泄方

高良薑　陳皮　莪术　烏梅

生薑　甘草　乾薑已上各等分

右用好紅椒三十粒去子同研爲細末每服二錢水一盞薑三片煎至七分溫服

治丈夫婦人心氣刺痛不可忍者

頭髮燒灰存性爲末　丁香七粒

右爲末酒一盞煎十數沸溫服立效

治惡心翻胃

厚朴 薑汁浸炙　蒼术　橘皮　甘艸

右爲細末每服一大錢空心鹽湯點服

東京王先生傳脾疼藥方

江子 半兩新瓦器中炒令黃色　杏仁 半兩同　牽牛 半兩同　橘皮 一兩同

右件並爲末用醋糊爲圓如○此大每服十圓薑湯下婦人血氣醋湯下產後氣痛艾湯下五圓丈夫酒食所傷隨物下小兒驚熱飯湯下痃積飯飲下蛔蟲腹痛史君子七枚爲末湯下

治脾疼不可忍及療冷氣疼

陳茱萸 一兩　浮椒 一兩　蚌粉 一兩炒赤色

右件爲末散糊爲圓如梧桐子大每服五圓用浸酒鹽湯任下遇發時服甚者不過二三服立有功效

治脾積氣痛婦人諸般氣痛

香附子五兩　莪术　甘艸各二兩

右件治令淨研爲細末每服二錢入鹽少許百沸點空心熱服

又方

良薑四兩　甘艸一兩　桂花半兩

右爲末每服一大錢入鹽沸湯點服

治脾疼神效方

荔枝核

右一味不拘多少爲末每服二錢熱醋湯調下

官方七香圓

丁香　檀香　丁香皮　木香

陳皮　甘松　三稜　莪术

縮砂　白豆蔻已上各半兩　香附子四兩

右爲末用麯餅湯泡和藥爲圓如菉豆大每服二十圓細嚼生薑湯下

治中酒不醒兼有酒食傷

巴豆一粒　烏梅二個　丁香三粒　胡椒五粒

右同擣爲細末入飯同杵二三千下爲圓如〇大每服五圓七圓細嚼丁香湯下小兒一圓與服

類證普濟本事方卷之三 終